

Hoja Técnica

Nutrifos 8-35-5[®]

COFEPRIS: 0129/VII/97

Descripción:

Compuesto inorgánico a base de sales de un multicompuesto de nitrógeno y fósforo unidos al catión potasio formando un compuesto único.



Usos

Para nutrir los cultivos agrícolas y conseguir el amarre de flor y fruto, con un buen balance de nutrición.

Composición Química

Componente (Base I.A)		% P/V
Nitrógeno (N)	Eq. a 80 gr. de I.A / lto.	8.0
Fosforo (P ₂ O ₅)	Eq. a 350 gr. de I.A / lto.	35.0
Potasio (K ₂ O)	Eq. a 50 gr. de I.A / lto.	5.0
Zinc (Zn)		0.5
Fierro (Fe)		0.5
Auxinas		20 ppm

Propiedades Fisioquímicas

- **Estado físico:** Líquido
- **Solubilidad:** 100%
- **PH al 1%:** 4.0
- **Apariencia:** Líquido café claro.
- **Densidad:** 1.34

Presentación

Porrones de 20 y 10 litros de polietileno de alta densidad.

Cajas de 12 x 1 lts. y de 2 x 5 lts.

Dosis

Cultivos	Dosis / HA
BRASSICAS-CRUCIFERAS. Brócoli, Coliflor, Espinacas, Lechuga, Apio, Repollo	Aplicar después de las hojas verdaderas a razón de 2 litros por hectárea en desarrollo aplicar a 5 litros/hectárea en el riego cada 15 días. En formación de tamaño, aplicar a razón 5 litros/hectárea por riego cada 8 días. Después aplicar una sola ocasión a los 15 días del llenado.
BERRIS. Arándanos. Zarzamora, Fresa y Frambuesa	Aplicar al inicio de la siembra y/o poda para la formación de raíz a razón de 2 litros/hectárea durante las primeras 4 semanas. Aplicar en la primera aparición de flores a razón de 4 litros/hectárea. Hasta el amarre de fruto. Aplicar durante la maduración de fruto durante 2 semanas a razón de 4 litros/hectárea.
CUCURBITÁCEAS. Melón, Pepino, Calabaza, Sandia	Aplicar después de las hojas verdaderas a razón de 2 litros por hectárea en desarrollo. Aplicar a 5 litros/hectárea en el riego cada 15 días. En formación de flor aplicar a razón 5 litros/hectárea por riego cada 8 días, hasta el final del ciclo reproductivo. La dosis en producción es de 2 aplicaciones por semana a razón de 4 litros/hectárea.
HORTALIZAS. Chile: Jalapeño, Pimiento Serrano, Habanero, Tomate Jitomate.	Aplicar después de las hojas verdaderas a razón de 2 litros por hectárea en desarrollo aplicar a 5 litros/hectárea en el riego cada 15 días. En formación de flor aplicar a razón 5 litros/hectárea por riego cada 8 días, hasta el final del ciclo reproductivo. La dosis en producción es de 2 aplicaciones por semana a razón de 4 litros/hectárea.

TUBÉRCULOS Y RAÍCES. Papa, Zanahoria, Camote, Rábano, Piña, Jengibre, Nabo.	Aplicar en el trasplante en el primer riego después del planteo a razón de 2 litros/semana en el riego. Después de 15 días del trasplante hacer aplicaciones de 5 litros/hectárea en el riego durante toda la etapa de desarrollo y formación de bulbo.
LEGUMINOSAS. Frijol, Ejote, Chicharo, Abas, Lentejas.	Aplicar después de las hojas verdaderas a razón de 2 litros por hectárea. En desarrollo aplicar a 5 litros/hectárea en el riego cada 15 días. En formación de flor aplicar a razón 5 litros/hectárea por riego cada 8 días, hasta el final del ciclo reproductivo. La dosis en producción es de 2 aplicaciones por semana a razón de 3 litros/hectárea.

Consulte a su técnico.

- **Biodegradable:** Dependiendo de las condiciones del suelo.
- **Fitotoxicidad:** Ninguna a las dosis recomendadas
- **Toxicidad al humano:** Ninguna a las dosis recomendadas
- **Compatibilidad:** Con la mayoría de los agroquímicos
- **Irritabilidad a la piel:** Solo concentrado
- **Precauciones:** No se ingiera y use guantes y gafas momento de la aplicación.
- **Almacenamiento:** A temperaturas menores de 40°C
- **Caducidad:** 2 años a partir de la fecha de elaboración
- **Area de aplicación:** Cultivos agrícolas.