

Hoja Técnica

Hormonis ZITT[®]

Descripción:

Conjunto de fitohormonas biológicamente activas, diseñadas para promover y generar división celular, aumentando el tamaño de los frutos de un manera uniforme, sin desequilibrar la actividad de la planta, teniendo un mejor desarrollo vegetativo y productivo.



Composición Química

Componente	% P/V
Fitohormonas biologicamente activas	0.2180
Citocininas	2,100 ppm
Giberelinas (A3)	30 ppm
Auxinas	50 ppm
Extractos de origen vegetal	74.782
Coadyuvantes	5.000
Diluyentes (agua)	20.000
Total	100.00

Propiedades Fisioquímicas

- **Estado físico:** Líquido
- **Solubilidad:** 100%
- **pH al 1%:** 7.0
- **Apariencia:** Líquido azul cristalino.
- **Gravedad específica:** 1.1

Presentación

Porrones de 20 y 10 litros de polietileno de alta densidad.

Cajas de 12 x 1 lts. y de 2 x 5 lts.

Dosis

Cultivos	Dosis (ml / l de agua)	Etapas de aplicación
Uva	2 a 4	10 a 15 días de la caída de la flor. Aplicar cuando exista amarre de fruto
Nogal	0.5 a 1	Aplicar en tres ocasiones: en las etapas de flores, amarre y desarrollo de fruto.
Melón / Sandía	3 a 5	Aplicar cuando exista el amarre del fruto. (Rueno) Hacer de dos a tres aplicaciones. Usar la cantidad de agua necesaria para cubrir el follaje.
Naranja / Cítricos	1 a 3	Aplicar en los primeros amarres del fruto o caída de las primeras flores. Aplicar dos veces más separadas por 15 días.
Hortalizas en general	2 a 4	Aplicar en el momento de amarre de fruto después de cada floración. Repetir cada 10 días sobre el mismo amarre del fruto. En caso de tener una sola floración, únicamente aplicar dos veces como se indica

- **Biodegradable:** Dependiendo de las condiciones del suelo.
- **Fitotoxicidad:** No se presenta en las dosis recomendada
- **Toxicidad al humano:** Ninguna a las dosis recomendadas
- **Compatibilidad:** Con la mayoría de los agroquímicos
- **Irritabilidad a la piel:** No reportada
- **Precauciones:** No se ingiera y use guantes y gafas momento de la aplicación.
- **Almacenamiento:** A temperaturas menores de 40°C
- **Caducidad:** 2 años a partir de la fecha de elaboración
- **Area de aplicación:** Cultivos agrícolas.