

Hoja Técnica


Biodux[®]

COFEPRIS No. 1166-301-304-18.3

OMRI: ARH: 14110

Descripción:

Compuesto orgánico de las sales potásicas de los ácidos grasos.



Usos

Supresor de plagas de origen natural orgánico, controla plagas como trips, mosca blanca, pulgón, araña roja e insectos de cutícula blanda.

Composición Química

Componente		% P/V
Sales potásicas de ácidos grasos (C ₁₇ H ₃₄ KO ₂)	Equivale a 150 GR. de I.A. por litro	15.00
Diluyentes y acondicionadores		85.00
Total		100.00

Propiedades Fisioquímicas

- **Estado físico:** Líquido
- **Solubilidad:** 100%
- **PH al 1%:** 8.0
- **Apariencia:** Líquido amarillo cristalino.

- **Gravedad específica:** 1.0

Presentación

Porrones de 20 y 10 litros de polietileno de alta densidad.

Cajas de 12 x 1 lts. y de 2 x 5 lts.

Dosis

Cultivos	Plagas	Dosis
Cultivos. Brocoli, coliflor, espinacas, cebolla, ajo, lechuga, apio, repollo.	Mosquita blanca, araña roja, pulgón, larva del gusano soldado, barrenador: estadía 1 y 2, trips.	500 ml. A 1.0 lts. Aplicar en un mínimo de 200 litros cuando se aplique al follaje. Cuando utilice volúmenes de 300 litros o más aplique la dosis de 1.0 a 1.5 lts.
Berris. Arándanos rojo y azul, mora, fresa, frambuesa.	Pulgón, mosquita blanca, araña roja, acaro del pacífico, acaro macdaniel, trips, piojo arenoso	1.0 lto. A 1.5 lts. Aplicar en un mínimo de 200 litros cuando se aplique al follaje. Cuando se utilice volúmenes de 300 litros o más aplique la dosis de 1.5 - 2.0 lts.
Cucurbitáceas. Melón, pepino, calabaza, sandía	Pulgón, mosquita blanca, araña roja, acaros, trips, piojo arenoso, larva de gusano estadía 1 y 2	1.0 lto. A 1.5 lts. Aplicar en un mínimo de 200 litros para las asperpciones. Cuando se utilice volúmenes de 300 litros o más aplique la dosis de 2.0 lts.
Hortalizas. Chile: jalapeño, pimiento, serrano, tomate, jitomate	Picudo, pulgón, trips, araña roja, mosquita blanca.	1.0 lto. A 1.5 lts. Aplicar en un mínimo de 200 litros para las asperpciones. Cuando se utilice volúmenes de 300 litros o más aplique la dosis de 2.0 lts.
Tuberculos y raíces. Papa, zanahoria, camote, rábano, piña, jengibre	Larvas de gusano, araña roja, mosquita blanca, escarabajo de la papa, mosca minadora, polilla, trips, pulgón	1.0 lto. A 1.5 lts. Aplicar en un mínimo de 200 litros para las asperpciones. Cuando se utilice volúmenes de 300 litros o más aplique la dosis de 2.0 lts.

- **Fitotoxicidad:** No se presenta en las dosis recomendada
- **Toxicidad al humano:** Ninguna a las dosis recomendadas
- **Biodegradable:** Dependiendo de las condiciones de suelo.
- **Compatibilidad:** Con la mayoría de los agroquímicos
- **Irritabilidad a la piel:** No reportada
- **Precauciones:** No se ingiera y use guantes y gafas momento de la aplicación.
- **Almacenamiento:** A temperaturas menores de 40°C
- **Caducidad:** 2 años a partir de la fecha de elaboración
- **Area de aplicación:** Cultivos agrícolas.