

Hoja Técnica

Hormonis Plus[®]

Descripción:

Conjunto de fitohormonas biológicamente activas, diseñadas para promover y generar raíces así como mejorar el desarrollo vegetativo y el amarre de flor y fruto en las plantas.



Composición Química

Componente	% P/V
Fitohormonas biologicamente activas	0.0360
Giberelinas	60ppm
Auxinas	240 ppm
Citocininas	60 ppm
Extractos de origen vegetal	82.964
Diluyentes (agua)	17.00
Total	100.00

Propiedades Fisioquímicas

- **Estado físico:** Líquido
- **Solubilidad:** 100%
- **PH al 1%:** 7.0

- **Apariencia:** Líquido café.
- **Densidad:** 1.0

Presentación

Porrones de 20 y 10 litros de polietileno de alta densidad.

Cajas de 12 x 1 lts. y de 2 x 5 lts.

Dosis

Cultivos	Dosis	Dosis
Acelga, espinaca, ajo, lechuga, brocoli, coles, cebolla	350 a 400ml. /ha	Al haber 3 a 5 pares de hojas y 8 a 12 días después.
Alfalfa	350 a 400ml. /ha	Aplicar cuando la planta tenga 10 o 15cms de altura, repetir a las 10 o 15 hojas después de cada corte.
Algodón	400ml. /ha	Inicio del cuadro y de 3 a 4 semanas después.
Banano	200ml. /ha c/mes	En recientes plantaciones aplicar por primera vez a los 45 días de haber emergido las plantas.
Caña de azúcar	400ml. /ha c/mes	En recientes plantaciones aplicar por primera vez a los 45 días de haber emergido las plantas.
Fresa	350 a 400ml. /ha	Al inicio de la floración repetir a las 3 a 4 semanas.
Granos y cereales	350 a 400ml. /ha	Al inicio del amacollamiento, al segundo nudo en maíz y sorgo.
Limón	400ml. /ha c/mes	Durante su producción efectuándolas a intervalos de 30 días.
Naranja, aguacate, mango, toronja, mandarina, y pomelo	350 a 400ml. /ha	15 días después de la floración, hasta la caída de los pétalos en intervalos de 8 a 10 días.
Ornamentales	75 ml. /100 lts. De agua	A las 10 a 20cm de altura 3 a 4 semanas después.

Papa, camote, betabel	400ml. /ha	Al inicio de la formación del tubérculo y repetir a los 15 a 20 días.
Papaya	200ml. /ha c/mes	Al inicio de la floración, repitiendo cada 3 a 4 semanas
Piña	400ml. /ha	Al los 30 a 40 días de trasplante y repetir a los 60 a 80 días.
	1.5 lts. /ha	Después de la caída de la flor y repetir cada 15 días.
Plátano	200ml. /ha c/ 60 días	En recientes plantaciones aplicar por primera vez a los 45 días de haber emergido.
Tobaco	400ml. /ha	A los 30 a 40 días de trasplante. Repetir si el capado fue alto.
Tomate, chile, berenjenas, leguminosas, curcubitáceas	350 a 400ml. /ha	Al inicio de la floración repetir a la aparición de frutos
Uva sin semilla	650 ml. /ha c/ 100 lts. de agua	Al inicio, al 50%, al 80% de la floración, cuando las bayas tengan de 6 a 8 mm, 2 más a intervalos de 5 días cada una.
Uva con semilla	2lt.c/1000 lts. de agua	Al inicio de la floración, y 3 semanas después.

- **Biodegradable:** Dependiendo de las condiciones del suelo.
- **Fitotoxicidad:** No se presenta en las dosis recomendadas
- **Toxicidad al humano:** Ninguna a las dosis recomendadas
- **Compatibilidad:** Con la mayoría de los agroquímicos
- **Irritabilidad a la piel:** No reportada
- **Precauciones:** No se ingiera y use guantes y gafas momento de la aplicación.
- **Almacenamiento:** A temperaturas menores de 40°C
- **Caducidad:** 2 años a partir de la fecha de elaboración
- **Area de aplicación:** Cultivos agrícolas.