

Hoja Técnica

Acervuz[®]

RSCO: 0110/VII/97

Descripción:

Micronutriente de hierro quelatado a base de EDDHA ortho-ortho y complejos orgánicos.



Composición Química

Componente		% P/V
Complejos de EDDHA-FIERRO (C ₁₈ H ₁₂ FeN ₂ O ₆)	Equivale a 60gr. de Fe-ORTHO-ORTHO de I.A. por litro	50.00
Complejos organicos carboxilatados de fierro	Equivale a 30gr. de Fe-COMPLEJADO I.A. por litro	15.00
Diluyentes (Agua)		35.00
Total		100.00

Propiedades Fisioquímicas

- **Estado físico:** Líquido
- **Solubilidad:** 100%
- **PH al 1%:** 4
- **Apariencia:** Líquido verde-café oscuro.
- **Gravedad específica:** 1.35

Presentación

Porrones de 20 y 10 litros de polietileno de alta densidad.

Cajas de 12 x 1 lts. y de 2 x 5 lts.

Dosis

Cultivos	Dosis
VERDURAS. Brócoli, Coliflor, Espinacas, Lechuga, Apio, Repollo.	Aplicar de 1.0 litros/hectárea en el riego. Durante las etapas críticas de desarrollo. Dosis foliar aplicar 1 litro en 200 litros de agua cuando la planeación técnica lo requiera. En dosis generales se recomienda aplicar cada 15 días.
UVA DE MESA.	Aplicar en la etapa de ENTRENE 0.5 litros. a 1.0 litros vía riego. El producto se absorbe perfectamente y no se bloquea. En ciclos de preproducción al existir primeros brotes después de la dormancia aplicar de 1.0 litro a 1.5 litro por hectárea. Durante el ciclo cada 8 días hasta la etapa de maduración y llenado del fruto.
BERRIS. Arándanos, Zarzamora, Fresa y Frambuesa	Aplicar de 1.0 litros/hectárea en el riego. Durante las etapas críticas de desarrollo. Dosis foliar aplicar 1 litro en 200 litros de agua cuando la planeación técnica lo requiera. En dosis generales se recomienda aplicar cada 15 días.
CUCURBITÁCEAS. Melón, Pepino, Calabaza, Sandía	Aplicar de 1.0 litros/hectárea en el riego. Durante las etapas críticas de desarrollo. Dosis foliar aplicar 1 litro en 200 litros de agua cuando la planeación técnica lo requiera. En dosis generales se recomienda aplicar cada 15 días.
HORTALIZAS. Chile: Jalapeño, Pimiento Serrano, Habanero, Tomate Jitomate	Aplicar de 1.0 litros/hectárea en el riego. Durante las etapas críticas de desarrollo. Dosis foliar aplicar 1 litro en 200 litros de agua. Cuando la planeación técnica lo requiera. En dosis generales se recomienda aplicar cada 15 días
TUBÉRCULOS Y RAÍCES. Papa, Zanahoria, Camote, Rábano, Piña, Jengibre, Nabo.	Aplicar de 1.0 litros/hectárea en el riego. Durante las etapas críticas de desarrollo. Dosis foliar aplicar 1 litro en 200 litros de agua cuando la planeación técnica lo requiera. En dosis generales se recomienda aplicar cada 15 días
ARBOLES FRUTALES. Nogal, Aguacate, Cítricos, Manzana, Durazno, Mango.	En aspersiones de alto volumen mezclar de 5 litros a 8 litros en 1,000 litros de agua. Hacer de 5 a 7 aplicaciones durante el ciclo del cultivo. Suspender las aplicaciones cuando inicia la etapa de maduración.

LEGUMINOSAS: Frijol, Ejote, Chícharo, Abas, Lentejas.	Aplicar de 1.0 litros/hectárea en el riego. Durante las etapas críticas de desarrollo. Dosis foliar aplicar 1 litro en 200 litros de agua cuando la planeación técnica lo requiera. En dosis generales se recomienda aplicar cada 15 días.
--	--

Consulte a su técnico.

- **Biodegradable:** Dependiendo de las condiciones de suelo.
- **Toxicidad al humano:** Ninguna a las dosis recomendadas.
- **Compatibilidad:** Con la mayoría de los agroquímicos.
- **Irritabilidad a la piel:** No reportada.
- **Precauciones:** No se ingiera y use guantes y gafas momento de la aplicación.
- **Almacenamiento:** A temperaturas menores de 40°C
- **Caducidad:** 2 años a partir de la fecha de elaboración
- **Area de aplicación:** Cultivos agrícolas.