


# Hoja Técnica

Nutriquel Zinc Nogal<sup>®</sup>

COFEPRIS-0034/II/97

## Descripción:

Compuesto orgánico de zinc quelatado a base de agentes quelatantes de origen orgánico.



## Usos

Es una mezcla ideal de zinc al 12% quelatado que trabaja en cualquier tipo de suelo y ph de agua, para cubrir las necesidades del cultivo en los ciclos de desarrollo vegetativo y productivo. Ideal para frutales y nogal por su alto contenido en zinc.

## Composición Química

| Componente                  |                               | % P/V |
|-----------------------------|-------------------------------|-------|
| Quelatos de zinc            | Eq. a 60 gr. de Zn por litro. | 6.00  |
| Complejos orgánicos de zinc | Eq. a 60 gr. de Zn por litro. | 6.00  |

## Propiedades Fisioquímicas

- **Estado físico:** Líquido
- **Solubilidad:** 100%
- **pH al 1%:** 4.5
- **Rango de estabilidad PH:** 3.0-12
- **Apariencia:** Líquido café oscuro.
- **Gravedad específica:** 1.25

## Presentación

Porrones de 20 y 10 litros de polietileno de alta densidad.

Cajas de 12 x 1 lts. y de 2 x 5 lts.

## Dosis

| Cultivos                          | Dosis / HA                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hortalizas y cultivos en general. | Aplicar de 1.5 a 3.5 Lts/Ha. efectuando de 2 a 3 aplicaciones durante las etapas críticas de desarrollo.                                                                           |
| Árboles frutales                  | Aplicar de 350 a 450 cc. por cada 100 Lts. de agua aspersora de alto volumen (1,000 litros) efectuándolo en las etapas de desarrollo, antes de la floración y formación de frutos. |
| Nogal                             | Aplicar 6 a 8 litros por cada 1,000 en cada aplicación. Aplicar al inicio de los brotes en primavera. Repetir 4 veces más durante los ciclos de cultivo.                           |

- **Biodegradable:** Dependiendo de las condiciones del suelo.
- **Fitotoxicidad:** Ninguna a las dosis recomendadas
- **Toxicidad al humano:** Ninguna a las dosis recomendadas
- **Compatibilidad:** Con la mayoría de los agroquímicos
- **Irritabilidad a la piel:** No reportada
- **Precauciones:** No se ingiera y use guantes y gafas momento de la aplicación.
- **Almacenamiento:** A temperaturas menores de 40°C
- **Caducidad:** 2 años a partir de la fecha de elaboración
- **Area de aplicación:** Cultivos agrícolas.