


Hoja Técnica

Nutriquel Calcio Plus[®]

Descripción:

Compuesto orgánico quelatado por medio de agentes complejantes de alta resistencia a suelos alcalinos. No se bloquea y es asimilado vía riego y/o foliar.



Composición Química

Componente		% P/V
Calcio quelatado (Ca)	Eq. a 80 gr. de Ca por litro Eq. a 96.8 gr. de CaO por litro	8.0

Propiedades Fisioquímicas

- **Estado físico:** Líquido
- **Solubilidad:** 100%
- **PH al 1%:** 5.5
- **Rango de estabilidad PH:** 4-11
- **Apariencia:** Líquido.
- **Densidad:** 1.32

Presentación

Porriones de 20 y 10 litros de polietileno de alta densidad.
Cajas de 12 x 1 lts. y de 2 x 5 lts.

Dosis

Cultivos	Dosis / HA
BRASSICAS-CRUCIFERAS. Brócoli, Coliflor, Espinacas, Lechuga, Apio, Repollo.	Aplicar de 2 a 3 litros/hectárea en el riego. Durante las etapas de desarrollo aplicar un litro por hectárea. Vía riego por cintilla, En el inicio de la etapa de maduración. Dosis foliar aplicar 1-2 litros en 200-250 litros de agua. En aplicadores de alto volumen sacar lo equivalente a la dosis promedio.
BERRIS. Arándanos. Zarzamora, Fresa y Frambuesa	Aplicar de 2 a 3 litros/hectárea en el riego. Durante las etapas de desarrollo aplicar un litro por hectárea. Vía riego por cintilla, En el inicio de la etapa de maduración. Dosis foliar aplicar 1-2 litros en 200-250 litros de agua. En aplicadores de alto volumen sacar lo equivalente a la dosis promedio.
CUCURBITÁCEAS. Melón, Pepino, Calabaza, Sandía	Aplicar de 2 a 3 litros/hectárea en el riego. Durante las etapas de desarrollo aplicar un litro por hectárea. Vía riego por cintilla, En el inicio de la etapa de maduración. Dosis foliar aplicar 1-2 litros en 200-250 litros de agua. En aplicadores de alto volumen sacar lo equivalente a la dosis promedio.
HORTALIZAS. Chile: Jalapeño, Pimiento Serrano, Habanero, Tomate Jitomate	Aplicar de 2 a 3 litros/hectárea en el riego. Durante las etapas de desarrollo aplicar un litro por hectárea. Vía riego por cintilla, En el inicio de la etapa de maduración. Dosis foliar aplicar 1-2 litros en 200-250 litros de agua. En aplicadores de alto volumen sacar lo equivalente a la dosis promedio.
TUBÉRCULOS Y RAÍCES. Papa, Zanahoria, Camote, Rábano, Piña, Jengibre, Nabo.	Aplicar de 2 a 3 litros/hectárea en el riego. Durante las etapas de desarrollo aplicar un litro por hectárea. Vía riego por cintilla, En el inicio de la etapa de maduración. Dosis foliar aplicar 1-2 litros en 200-250 litros de agua. En aplicadores de alto volumen sacar lo equivalente a la dosis promedio.
ARBOLES FRUTALES. Nogal, Aguacate, Cítricos, Manzana, Durazno, Mango.	En aspersiones de alto volumen mezclar de 5 litros a 8 litros en 1,000 litros de agua. Hacer de 5 a 7 aplicaciones durante el ciclo del cultivo. Aplicaciones cuando inicia la etapa de maduración.
LEGUMINOSAS: Frijol, Ejote, Chicharo, Abas, Lentejas.	Aplicar de 1 a 2 litros/hectárea en el riego. Durante las etapas de desarrollo aplicar un litro por hectárea. Vía riego por cintilla, después de las 6 semanas aplicar 2 litros por hectárea hasta el inicio de la etapa de maduración. Dosis foliar: Aplicar 1 litro en 200-250 litros de agua. En aplicadores de alto volumen sacar lo equivalente a la dosis promedio.

Consulte a su técnico.

- **Biodegradable:** Dependiendo de las condiciones del suelo.

- **Fitotoxicidad:** Ninguna a las dosis recomendadas
- **Toxicidad al humano:** Ninguna a las dosis recomendadas
- **Compatibilidad:** Con la mayoría de los agroquímicos
- **Irritabilidad a la piel:** No reportada
- **Precauciones:** No se ingiera y use guantes y gafas momento de la aplicación.
- **Almacenamiento:** A temperaturas menores de 40°C
- **Caducidad:** 2 años a partir de la fecha de elaboración
- **Area de aplicación:** Cultivos agrícolas.